

## MEDICINA DOMÉSTICA.

### *Del panadizo o inflamacion aguda de las estremidades de los dedos.*

**Q**ue se ha dicho en los artículos del flegmon y del absceso, es aplicable generalmente á los flegmones y absesos de todas las partes del cuerpo; pero hay algunos que por la naturaleza del tejido que ocupan, ó por las circunstancias que los acompañan, merecen algunas consideraciones particulares, y tal es entre otros el panadizo ó flegmon de las estremidades de los dedos.

Los dedos son los principales órganos del tacto: están recubiertos de una piel muy densa y resistente, sembrada de infinidad de hilillos nerviosos; compuestos de un tejido celular muy apretado, y de capas fibrosas y tendones que reposan sobre una membrana muy delicada que reviste el hueso.

Esta organizacion particular que los hace muy sensibles y la poca estensibilidad que tienen sus tejidos para desarrollarse, da lugar á inflamaciones muy dolorosas, y á síntomas muy graves y molestos, segun el grado de su intensidad y las partes que ocupan, lo que ha obligado á distinguir los panadizos en los grados ó variedades siguientes.

1º El *panadizo erisipelatoso* es el mas leve y frecuente: consiste en la inflamacion superficial ó erisipela de la

piel de la yema de los dedos ó la parte que rodea la uña, al cual se le da vulgarmente el nombre de uñero.

2º El *panadizo flegmonoso* es la inflamacion del tejido celular que se halla debajo de la piel, y deseminado entre los tendones y partes fibrosas.

3º El *panadizo fibroso ó tendinoso*, que es el mas grave de los tres, ataca las mismas partes que los anteriores, y ademas las partes fibrosas, las vainas de los tendones y la membrana que reviste el hueso.

Algunas veces el panadizo erisipelatoso ó del primer grado, adquiere el segundo, y éste el tercer grado de la enfermedad.

Las causas mas comunes del panadizo, son las violencias exteriores, las heridas, las contusiones, las escoriaciones, el arrancamiento de los padrastros, las picaduras con agujas, alfileres, lesnas, espinas ú otros cuerpos punzantes y agudos, la introduccion de alguna astilla de madera, la impresion de líquidos ó sustancias irritantes en personas no acostumbradas, las quemaduras y todas las causas irritantes que pueden escitar vivamente las estremidades de los dedos. Raras veces se produce por causas internas.

El panadizo erisipelatoso ó del pri-