

mer grado, es ocasionado por causas ligeras ó en personas poco irritables. Sus síntomas son, un dolor moderado, acompañado de viva comezon, una hinchazon ligera, rosada, lustrosa, caliente y animada de pulsaciones. Despues de 12 ó de 24 horas, y tambien de tres ó cuatro dias, el dolor aumenta y aparece una ampolla blanca, llena de un poco de serosidad opaca ó rojiza, ocupando la llera del dedo ó el contorno de la uña. Ésta revienta espontáneamente, ó se abre y deja descubierta el dermis rojo intacto, ó ligeramente corroído y cubierto de una escudacion blanquecina. Raras veces se halla perforado hasta el tejido celular.

En el panadizo flegmonoso ó de segundo grado, el dolor es mas intenso, mas profundo y mas quemante que en el caso anterior, desde el principio de la enfermedad. La hinchazon, la rubicundez, se presentan mas tarde; pero con mucha fuerza, y se propagan las mas veces sucesivamente á todo el dedo, á la mano, á la muñeca, y aun al brazo, siguiendo la parte interna en la direccion de los tendones hasta hincharse algunas veces las glándulas del sobaco.

Cuando el panadizo flegmonoso llega á su último grado y termina, por la supuracion, la podre destruye grandes porciones del tejido celular y se desliza por entre los tendones, formando diversos depósitos ó tumores en la palma de la mano cerca de la muñeca y aun en el antebrazo. Otras veces se forma un tumor recogido, redondo, oscuro á los lados de los dedos, con toda la forma de un divieso ó tlacotillo que revienta por una porcion de agujero,

como sucede en esta clase de tumores.

Cuando se forma sobre el lomo del dedo, es un flegmon ó tumor comun como en las demas partes del cuerpo.

El panadizo fibroso se forma por la trascendencia del flegmonoso, cuando éste es muy intenso, ó porque las causas que producen la enfermedad en su principio, son muy irritantes ó llegan hasta las vainas de los tendones de las extremidades de los dedos, ó á la membrana que reviste el hueso.

En este caso la inflamacion comienza muy profundamente. En lo exterior tal vez no se nota ninguna rojura ni hinchazon; cuando al interior se siente un dolor sordo y punzante y un calor ardiente como la quemadura de una asua. Pasados algunos dias, sobrevienen con mucha violencia y mucha mas fuerza, todos los síntomas y consecuencias del panadizo flegmonoso. La gravedad del mal sin embargo, no depende sólo de los sufrimientos de la parte afectada, sino del trastorno general manifestado por la agitacion estremada; la falta de sueño, la calentura, el delirio, las convulsiones, la basea, la sed y todos los síntomas de una fiebre. Si la enfermedad termina por la gangrena ó por la supuracion y destruccion de partes estensas ó importantes, puede comprometer la existencia ó la pérdida de la parte enferma, ó por lo menos grandes úlceras y la desnudacion y carie del hueso y pérdida de algun dedo.

Tratamiento curativo del panadizo.

La curacion del panadizo se compone de diferentes medios que se apli-